

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

DLP-6-6-78452061

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL XXXX

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 18 - 1er/06/1978

GRANDES CULTURES

Texte établi avec la participation de la Ferme de Loudes (11)
à l'intention des agriculteurs du Lauragais

CEREALES

ROUILLE JAUNE

LA ROUILLE JAUNE s'étend. De nouvelles parcelles contaminées méritent une intervention rapide, compte-tenu du développement constaté de cette maladie.

OBSERVEZ VOS CHAMPS, particulièrement ceux des variétés CORIN, DUCAT, BIDI 17, DARIUS & ANTARES.

Sur toute la parcelle, de nombreuses plantes peuvent maintenant être touchées, montrant ^{chaque} trois à cinq pas, les jaunissements en bandes et pustules orangées caractéristiques sur les premières ou deuxième feuilles comptées à partir de l'épi.

TRAITEZ DANS TOUS CES CAS D'INFESTATION RECONNUE AVEC CALIXINE M (tridémorphe + manèbe)

à la dose de 5 kg de produit commercial à l'hectare.

SEPTORIOSE

LA SEPTORIOSE trouve, par ces temps orageux, des conditions favorables à une progression sur épi, là où elle a été constatée sur feuilles.

Nous expérimentons les possibilités de recours au traitement après l'orage qui favorise cette contamination lorsque les épis sont dégagés.

SI VOUS N'AVEZ PAS TRAITE PREVENTIVEMENT, ABSTENEZ-VOUS.

PUCERON et ROUILLE BRUNE

LES PUCERONS et la ROUILLE BRUNE sont rares, mais peuvent se développer rapidement. Nous ferons le point dans un prochain bulletin.

CULTURES PORTE-GRAINES

- LUZERNE PORTE-GRAINES :

Toutes les cultures présentent une population alarmante de PHYTONOMES et d'APIONS. Traiter à l'aide de méthidathion (ULTRACIDE 20 à la dose de 2,6 l de produit commercial à l'hectare et dans 500 à 600 litres d'eau. Ce produit est le mieux classé dans les essais de la Fédération Nationale des Agriculteurs multiplicateurs de semences (F.N.A.M.S.) conduits dans le Lauragais en 1977.

- CAROTTES PORTE-GRAINES :

La F.N.A.M.S. préconise, contre la TEIGNE au stade de la sortie de l'ombelle primaire, un traitement à l'aide de phosalone (Zolone à la dose de 4,5 l de produit commercial à l'hectare). Cette protection est à renouveler d'ici quinze jours.

/ COLZA /

GRANDES CULTURES

Le bilan de cette culture suivie depuis le début février montre à ce jour un parasitisme très peu abondant ou trop tardif pour être dommageable.

C'est pourquoi aucune proposition de traitements n'a été faite jusqu'à présent.

CÉRÉALES

ROUILLE JAUNE

LA ROUILLE JAUNE a été observée sur de nouvelles parcelles contaminées méritant une intervention rapide, compte-tenu du développement constaté de cette maladie.

OBSERVÉS SUR CHAMPS, particulièrement ceux des variétés CORIN, DUCAT, BIDI 17, DARIUS & ANTARES.

Sur toute la parcelle, de nombreuses plantes peuvent maintenant être touchées; montrant trois à cinq pas, les jaunissements en bandes et pustules orangées caractéristiques de la ROUILLE JAUNE ou de la ROUILLE BRUNE.

TRAITER AVEC UN FONGICIDE A ACTION SYSTEMIQUE (TRIDEMORPH + manébo)

à la dose de 5 kg de produit commercial à l'hectare.

SEPTORIOSE

LA SEPTORIOSE trouve, par ces temps orageux, des conditions favorables à une progression sur épi. La on elle a été constatée sur feuilles.

Nous expérimentons les possibilités de recours au traitement après l'orage qui favorise cette contamination lorsque les épis sont dégagés.

SI VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ PRÉVENTIVEMENT, ABSTENEZ-VOUS.

PUCERON et ROUILLE BRUNE

Tirage du 1er juin 1978 1 - 000 ex.

LES PUCERONS et la ROUILLE BRUNE sont rares, mais peuvent se développer rapidement. Nous ferons le point dans un prochain bulletin.

CULTURES PORTE-GRAINES

- LIGNE PORTE-GRAINES :

Toutes les cultures présentent une population alarmante de PHYTONOMES et d'APIONS. Traiter à l'aide de méthidathion (ULTRACIDE 20 à la dose de 2,5 l de produit commercial à l'hectare et dans 500 à 600 litres d'eau. Ce produit est le mieux classé dans les essais de la Fédération Nationale des Agriculteurs multiplicateurs de semences (F.N.A.M.S.) conduits dans le Languedoc en 1977.

- CAROTTES PORTE-GRAINES :

La F.N.A.M.S. préconise, contre la TIGNE au stade de la sortie de l'ovaire primaire, un traitement à l'aide de phosalone (Xolone à la dose de 4,5 l de produit commercial à l'hectare). Cette protection est à renouveler d'ici quinze jours.